

NARCAN (Naloxona HCl)

el aerosol nasal

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instrucciones de Respuesta a Sobredosis de Opioides

Utilice NARCAN Nasal Aerosol (clorhidrato de naloxona) para una sobredosis de opioides conocida o sospechada en adultos y niños. Importante: Sólo para uso en nariz.

No retire ni pruebe el aerosol nasal NARCAN hasta que esté listo para usar.

Identificar

Opiáceos

Sobredosis

y Compruebe

si hay Respuesta

Pregúntale a la persona si está bien y grita el nombre.

Agitar los hombros y frotar firmemente la mitad de su pecho.

Compruebe si hay signos de sobredosis de opioides:

- No despertará ni responderá a su voz o tacto
- La respiración es muy lenta, irregular o se ha detenido
- La parte central de su ojo es muy pequeña, a veces llamada "pupilas"



Coloque a la persona de espaldas para recibir una dosis de NARCAN Nasal Aerosol.

Dar

NARCAN, NUEVO el aerosol nasal

Retire NARCAN el aerosol nasal de la caja.

Pele la pestaña con el círculo para abrir el aerosol nasal NARCAN.




Sostenga el aerosol nasal NARCAN con el pulgar en la parte inferior del émbolo y los primeros y medios dedos a ambos lados de la boquilla.

Inserte suavemente la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales.

- Incline la cabeza de la persona hacia atrás y proporcione apoyo debajo del cuello con la mano. Inserte suavemente la punta de la boquilla en una fosa nasal, hasta que los dedos de cada lado de la boquilla estén contra la parte inferior de la nariz de la persona.

Presione firmemente el émbolo para darle la dosis de aerosol nasal NARCAN.

- Retire el aerosol nasal NARCAN de la fosa nasal después de administrar la dosis.



Llamar Emergencia Médica

Ayuda Evaluar

Y Apoyo

Mueva a la persona de su lado (posición de recuperación) después de administrar aerosol nasal NARCAN.

Vigila a la persona de cerca.

Si la persona no responde despertando, con la voz o el tacto, o respirando normalmente se puede administrar otra dosis. El aerosol nasal NARCAN se puede dosificar cada 2 a 3 minutos, si está disponible.

Repita el paso 2 con un nuevo aerosol nasal NARCAN para otra dosis en la

otra fosa nasal. Si hay aerosoles nasales NARCAN adicionales disponibles, repita el paso 2 cada 2 a 3 minutos hasta que la persona responda o reciba ayuda médica de emergencia.

